

Liite 3. Selvitysalueella havaitut käävät.

Antrodia serialis (rivikäätä)
Antrodia xantha (katkokäätä)
Ceriporiopsis sp. *
Cerreana unicolor (pörrökäätä)
Fomes fomentarius (taulakäätä)
Fomitopsis pinicola (kantokäätä)
Ganoderma lipsiense (lattakäätä)
Gloeophyllum sepiarium (aidaskäätä)
Inonotus radiatus (lepänkäätä)
Ischnoderma benzoinum (tervakäätä)
Junghuhnia nitida (risukarakäätä)
Lenzites betulinus (koivunhelttakäätä)
Oligoporus sp. *
Perenniporia subacida (korkkikerroskäätä)
Phellinus conchatus (raidankäätä)
Phellinus ferrugineofuscus (ruostekäätä)
Phellinus ignarius (arinakäätä)
Phellinus punctatus (kuhmukäätä)
Phellinus tremulae (haavankäätä)
Piptoporus betulinus (pötkelökäätä)
Polyporus brumalis (talvikäätä)
Polyporus tubaeformis (torvikäätä) **
Postia caesia (sinihaprakäätä)
Postia lactea (valkohaparakäätä) ***
Postia stiptica (karvashaparakäätä)
Postia tephroleuca (harmohaparakäätä)
Skeletocutis carneogrisea (routakäätä)
Trametes ochracea (pinovyökäätä)
Trichaptum abietinus (kuusenkynsikäätä)
Tyromyces chioneus (liitukäätä)

* *Tarkempi tunnistaminen edellyttäisi mikroskopointia, johon ei ollut mahdollisuutta. Näyte.*

** *Luetaan nykyään kuuluvaksi lajiin kastanjakäätä (Polyporus badius)*

*** *Luetaan nykyään kuuluvaksi lajiin harmohaparakäätä (Postia tephroleuca)*